

درس دوم: ساختارهای درون یک گروه

۱ مقدمه

گروه، علیرغم تعریف ساده‌ای که دارد، می‌تواند ساختاری بسیار غنی داشته باشد. شناختن این ساختارها به شناخت کل گروه کمک می‌کند. ضمناً چنانکه در همین فصل خواهیم دید، خواص و قضایایی که از این قضایا نتیجه می‌شوند، نتایج بسیار جالبی در حوزه‌های دیگر ریاضیات مثلاً در نظریه اعداد دارند. در این فصل با بعضی از این ساختارها آشنا می‌شویم. نخست با مفهوم زیرگروه¹، هم مجموعه‌های راست و چپ²، زیرگروه بهنجار³ و گروه خارج قسمت⁴ آشنا می‌شویم. هم چنین در پایان فصل با کلاس‌های تزویجی⁵ و سپس مرکز گروه⁶ آشنا می‌شویم. نیازی به گفتن نیست که در این بررسی خود را به ساده‌ترین مفاهیم و ساده‌ترین مثال‌ها محدود کرده ایم.

۲ زیرگروه

تعریف: هرگاه H یک زیرمجموعه دلخواه از گروه G باشد، آن را یک زیرگروه G می‌نامیم اگر خود یک گروه باشد.

مثال: هرگاه Z گروه اعداد صحیح باشد آنگاه به ازای هر $m, n \in Z$ یعنی مجموعه اعدادی که مضرب عدد صحیح n هستند، یک زیرگروه تشکیل می‌دهد.

مثال: در گروه S_3 یعنی گروه جایگشت‌ها، مجموعه‌ی‌های $\{e, \sigma_1\}$ یا $\{e, \sigma_2\}$ هرکدام یک زیرگروه هستند.

مثال: در گروه $GL_n(R), SL_n(R)$ یعنی مجموعه‌ی ماتریس‌های وارون پذیر با دترمینان برابر با یک زیرگروه است.

مثال: در گروه $GL_n(R)$ مجموعه ماتریس‌های بلوکه قطری که به صورت

$$\begin{pmatrix} g_1 \in GL_k(R) & 0 \\ 0 & g_2 \in GL_{n-k}(R) \end{pmatrix} \quad (1)$$

Subgroup¹
Right and Left Cosets²
Normal Subgroup³
Quotient Group⁴
Conjugacy Classes⁵
Center of the Group⁶

هستند تشکیل یک زیرگروه می دهند. این زیرگروه با نماد $GL_k(R) \oplus GL_{n-k}(R)$ نشان می دهند.

قضیه: اگر H زیر مجموعه گروه G باشد، در این صورت زیرگروه G است اگر و فقط اگر

$$\text{الف: } \forall a, b \in H \quad ab \in H$$

$$\text{ب: } \forall a \in H \quad a^{-1} \in H$$

اثبات: اگر H یک زیرگروه باشد بوضوح خاصیت های الف و ب برقرار هستند. حال فرض کنید که خاصیت های الف و ب برقرار باشند. در این صورت از ترکیب الف و ب به ازای $b = a^{-1}$ نتیجه می گیریم که $e \in H$ و در نتیجه H زیرگروه می شود.

قضیه: اگر G یک گروه متناهی و H زیرمجموعه آن باشد، آنگاه H یک زیرگروه است اگر و فقط اگر

$$\text{الف: } \forall a, b \in H \quad ab \in H$$

به عبارت دیگر برای گروه های متناهی دیگر شرط ب در قضیه اول ضروری نیست.

اثبات: اگر H تنها یک عضو e داشته باشد که به طور بدیهی H زیرگروه می شود. بنابراین فرض می کنیم که عضوی مثل $a \neq e$ در H وجود دارد و رشته اعضای a, a^2, a^3, \dots را در نظر می گیریم. بنابراین فرض الف تمام اعضای این رشته در H قرار دارند. از آنجا که گروه G متناهی است، تمام اعضای این رشته نمی توانند باهم متفاوت باشند و بنابراین به ازای یک m و $n > m$ در این رشته خواهیم داشت:

$$a^m = a^n, \quad (2)$$

و از آنجا با ضرب کردن طرفین در $a^{-1} \in G$ بدست می آوریم:

$$a^{n-m} = e. \quad (3)$$

پس عضو واحد گروه درون H است. هم چنین نتیجه می گیریم که عضو $a^{-1} = a^{n-m-1}$. پس معکوس یک عضو $a \in H$ نیز درون خود H است. با اضافه کردن این دو خاصیت به الف نتیجه می گیریم که H یک زیرگروه است.

۱.۲ مثال های بیشتری از زیرگروه ها

مثال: هرگاه S یک مجموعه دلخواه و $A(S)$ گروه نگاشت های وارون پذیر روی آن باشد آنگاه به ازای هر نقطه دلخواه $x_0 \in S$

یک زیرگروه $H_{x_0} \subset A(S)$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$H_{x_0} := \{\phi \in A(S) \mid \phi(x_0) = x_0\}. \quad (4)$$

این مثال را می توان به این شکل نیز تعمیم داد که اگر $S_0 \subset S$ آنگاه مجموعه تمام نگاشت هایی که نقاط S_0 را به نقاطی از S_0 می نگارند تشکیل یک زیرگروه می دهند.

مثال: هرگاه G یک گروه و $a \in G$ عضوی از آن باشد آنگاه تعریف می کنیم:

$$\langle a \rangle := \{g \in G \mid g = a^i, \text{ for some } i \in \mathbb{Z}\}. \quad (5)$$

در این صورت $\langle a \rangle$ یک زیرگروه G است و زیرگروه تولید شده توسط a خوانده می شود.

مثال: هرگاه G یک گروه و W یک زیر مجموعه G باشد، $\langle W \rangle$ را مجموعه همه عنصرهایی می گیریم که قابل نمایش به صورت حاصل ضرب عنصرهایی از W باشند که به نماهای مثبت، منفی یا صفر رسیده باشند. در این صورت $\langle W \rangle$ زیرگروه تولید شده توسط W نامیده می شود.

مثال: روابط زیر بین گروه های ماتریسی برقرار است: خواننده می تواند صحت این روابط را تحقیق کند:

$$SO_n(\mathbb{R}) \subset O_n(\mathbb{R}) \subset GL_n(\mathbb{R}) \subset GL_n(\mathbb{C}), \quad (6)$$

$$SU_n(\mathbb{C}) \subset U_n(\mathbb{C}) \subset GL_n(\mathbb{C}). \quad (7)$$

۳ هم مجموعه ها

در حساب مقدماتی با مفهوم هم باقیمانده ها آشنا شده ایم. می گوییم دو عدد p و q نسبت به عدد n هم باقیمانده اند اگر تفاضل آنها مضربی از n باشد، یعنی $p - q = kn$. هم باقیمانده گی یک رابطه هم ارزی است و به این ترتیب تمامی اعداد صحیح به n کلاس هم ارزی متمایز تقسیم می شوند. می دانیم که مفهوم هم باقیمانده گی در حساب دارای اهمیت زیادی است. آیا می توان این مفهوم را گسترش داد؟ پاسخ آن مثبت است. در واقع هرگاه به این مفهوم از دیدگاه نظریه گروه نگاه کنیم راه تعمیم آن نیز

روشن می شود. کافی است که دقت کنیم که مجموعه اعداد صحیح یک گروه است که آن را با Z و مجموعه مضارب n نیز یک گروه است که آن را با nZ نمایش می دهیم. بنابراین مفهوم هم باقیماندگی به این صورت است که هر دو عدد p و q در گروه Z هم ارزند هرگاه تفاضل آنها در زیر گروه nZ باشند. به عبارت دیگر داریم

$$p \sim q \iff p + (-q) \in nZ. \quad (۸)$$

با توجه به این مطالب می توانیم مفهوم هم باقیماندگی یا به طور کلی هم ارزی نسبت به یک زیر گروه را تعریف کنیم.
تعریف: هرگاه H یک زیر گروه G باشد آنگاه

$$a \sim_R b \text{ mod } H \iff ab^{-1} \in H. \quad (۹)$$

اثبات این که این رابطه یک رابطه هم ارزی است، آسان است. با توجه به رابطه بالا، هرگاه $a \sim_R b$ ، آنگاه یک $h \in H$ وجود دارد به این معنی که $a = bh$ یا $b = ah^{-1}$. بنابراین هر دو عضوی که هم ارز باشند، هر کدام را می توان به صورت حاصل ضرب راست دیگری در یک عضو از H نوشت. این امر نامگذاری \sim_R را توجیه می کند. هرگاه بخواهیم تمام عناصری را که بایک عنصر مثل a هم ارز هستند، پیدا کنیم می بایست تمام عناصر h را از طرف راست در آن ضرب کنیم. به این ترتیب یک زیر مجموعه از گروه G بدست می آید به صورت زیر

$$aH := \{ah \mid h \in H\}. \quad (۱۰)$$

این مجموعه یک هم مجموعه راست a خوانده می شود. اعضای آن همه با هم، هم ارز هستند. هر عضوی که با a هم ارز باشد نیز در این مجموعه است. ضمناً بین aH و H یک تناظر یک به یک برقرار است. زیرا نگاشت پوشا و یک به یک زیر را می توان بین H و aH برقرار کرد:

$$\phi : H \longrightarrow aH, \quad \phi(x) = xh. \quad (۱۱)$$

برخواننده است که یک به یک بودن و پوشا بودن این نگاشت را ثابت کند. از این قضیه و اثبات می توان نتیجه گرفت که رابطه ی یک به یک بین همه ی هم مجموعه های راست وجود دارد. این تناظر را به شکل مستقیم نیز می توان ثابت کرد.

دقت کنید که به دلیل اینکه گروه می تواند غیر آبدلی باشد، دو نوع رابطه هم ارزی می توانیم تعریف کنیم که تعریف دوم به شکل زیر است:

تعریف: هرگاه H یک زیر گروه G باشد آنگاه

$$a \sim_L b \text{ mod } H \iff a^{-1}b \in H. \quad (۱۲)$$

دقت کنید که هر کدام از روابط \sim_L و \sim_R جداگانه روابط هم ارزی هستند ولی نمی توان از یکی دیگری را نتیجه گرفت. بنابراین این دو رابطه یک گروه را به دو شکل متفاوت افراز می کنند. به همان ترتیبی که هم مجموعه راست از a را تعریف کردیم می توانیم هم مجموعه چپ را نیز تعریف کنیم یعنی

$$Ha := \{ha \mid h \in H\}. \quad (13)$$

از این که هم مجموعه ها همه تناظر یک به یک با زیرگروه H دارند به یک نتیجه مهم می رسیم و آن اینکه اگر زیرگروه H متناهی باشد، آنگاه تمام هم مجموعه ها تعداد اعضایشان با مرتبه H یا همان تعداد عناصر H برابر است. این مشاهده ما را به قضیه مهمی موسوم به قضیه لاگرانژ می رساند:

قضیه لاگرانژ: هرگاه G گروهی متناهی و H یک زیرگروه آن باشد آنگاه $|H| \mid |G|$.

تعریف: هرگاه $a \in G$ یک عضو از یک گروه باشد، به کوچکترین عدد m که در رابطه $a^m = e$ صدق کند، مرتبه a می گوئیم و آن را با $|a|$ نمایش می دهیم. اگر چنین عددی وجود نداشته باشد می گوئیم مرتبه a نامتناهی دارد.

قضیه: مرتبه یک عضو مرتبه گروه را می شمارد، به عبارت دیگر

$$\forall a \in G \quad |a| \mid |G|. \quad (14)$$

اثبات: مجموعه $\langle a \rangle := \{e, a, a^2, \dots\}$ را در نظر می گیریم. این مجموعه می بایست متناهی باشد. با استدلالی که در مورد دومین قضیه این درس کردیم نتیجه می گیریم که $\langle a \rangle$ یک زیرگروه G از مرتبه $|a|$ است و بنابراین قضیه قبل نتیجه می گیریم که $|a| \mid |G|$ را می شمارد.

از این قضیه دو نتیجه می گیریم:

نتیجه یک:

$$\forall a \in G \quad a^{|G|} = e. \quad (15)$$

اثبات: در قضیه قبل دیدیم که مرتبه a مرتبه گروه را می شمارد یعنی عدد صحیحی مثل k وجود دارد به قسمی که $|G| = k|a|$. حال نتیجه می گیریم

$$a^{|G|} = a^{k|a|} = e^k = e. \quad (16)$$

نتیجه دو: (قضیه اویلر) اگر n یک عدد صحیح مثبت و عدد a نسبت به آن اول باشد آنگاه

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}, \quad (17)$$

که در آن $\phi(n)$ تعداد اعداد کوچکتر از n است که نسبت به n اول هستند.

اثبات: می دانیم که Z_n^* با عمل ضرب یک گروه است. مرتبه این گروه یعنی تعداد اعداد صحیح کوچکتر از n که نسبت به آن اول هستند. این تعداد برابر است با $\phi(n)$. حال اگر a عددی بزرگ تر از n باشد باقیمانده تقسیم آن بر n را با a' نشان می دهیم در نتیجه $a = kn + a'$ که a' عددی است که نسبت به n اول است (زیرا اگر چنین نباشد a نیز نسبت به n اول نخواهد بود) و از آن نیز کوچکتر است. در نتیجه $a' \in Z_n^*$. با توجه به نتیجه یک خواهیم داشت:

$$a'^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}. \quad (18)$$

حال با جایگذاری $a' = a - kn$ و استفاده از بسط دو جمله ای بدست می آوریم که

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}. \quad (19)$$

نتیجه سه: (قضیه کوچک فرما) اگر p عددی اول باشد و a هر عدد دلخواهی باشد آنگاه

$$a^p \equiv a \pmod{p}. \quad (20)$$

اثبات: اگر a نسبت به p اول نباشد، چون p خود عدد اول است، معنایش این است که به طور کامل دارای فاکتور p است و بنابراین بر آن قابل تقسیم است. در نتیجه خواهیم داشت $a^p \equiv a \equiv 0 \pmod{p}$. اگر a نسبت به p اول نباشد آنگاه با استفاده از قضیه اویلر و اینکه $\phi(p) = p - 1$ ، خواهیم داشت

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \quad (21)$$

و از آنجا با ضرب کردن طرفین در a بدست می آوریم که $a^p \equiv a \pmod{p}$. در نتیجه برای هر عدد دلخواه a تساوی ۲۰ را ثابت کرده ایم.

قضیه: هرگاه G گروهی متناهی و از مرتبه عدد اول p باشد، آنگاه G یک گروه دوری است.

اثبات: اگر G عضوی غیر از e نداشته باشد که قضیه بدیهی است. پس فرض می کنیم که عضوی غیر از e مثل a دارد. می دانیم که $\langle a \rangle := \{e, a, a^2, \dots\}$ یک زیرگروه G است. چون گروه G متناهی است، این زیرگروه نیز باید متناهی باشد. اگر مرتبه آن از مرتبه G کمتر باشد باید عدد p را بشمارد که با توجه به اول بودن عدد p تنها وقتی ممکن است که مرتبه آن مساوی با خود p باشد. در نتیجه زیرگروه $\langle a \rangle$ با خود G یکی می شود و G گروه دوری می شود.

۴ زیر گروه های بهنجار و گروه های خارج قسمت

دیدیم که برای یک زیرگروه دلخواه، هم مجموعه های چپ و راست لزوماً یکی نیستند. در حالت خاصی یک زیر گروه، هم مجموعه های چپ و راست اش با هم یکسان خواهند بود. به عبارت دیگر از رابطه ی $a \sim_L b$ می توان رابطه ی $a \sim_R b$ را نتیجه گرفت. وقتی که تعریف این دو رابطه هم ارزی را در نظر بگیریم براحتی می توانیم خاصیت این زیر گروه های ویژه را پیدا کنیم. کافی است که به ازای هر $b \in G$ و هر $h \in H$ بتوانیم bh را به صورت $h'b$ بنویسیم که در آن h' عضو دیگری از زیر گروه H است. این خاصیت را در تعریف زیر بیان می کنیم:

تعریف: زیر گروه H از گروه G را بهنجار می گوئیم هرگاه

$$\forall g \in G, \forall h \in H \quad ghg^{-1} \in H. \quad (22)$$

برای چنین زیر گروهی یک هم مجموعه راست یک هم مجموعه چپ نیز هست. در واقع داریم:

قضیه: اگر H زیر گروه بهنجار G باشد آنگاه به ازای هر a ، $aH = Ha$.

اثبات: نخست ثابت می کنیم که $aH \subset Ha$:

$$if \quad x \in aH \longrightarrow x = ah \quad \longrightarrow \quad x = h'a \quad x \in Ha, \quad \longrightarrow \quad aH \subset Ha. \quad (23)$$

با همین استدلال می توان ثابت کرد که $Ha \subset aH$ و در نتیجه قضیه ثابت می شود.

قضیه: زیر گروه H از G بهنجار است اگر و فقط اگر

$$\forall g \in G \quad gHg^{-1} = H. \quad (24)$$

اثبات: فرض کنید که زیر گروه بهنجار است. بنابراین تعریف واضح است که $gHg^{-1} \subset H$. حال باید ثابت کنیم که $H \subset gHg^{-1}$. برای این کاریک عضو مثل $h \in H$ در نظر می گیریم. می نویسیم:

$$h = g(g^{-1}hg)g^{-1} = gh'g^{-1} \in gHg^{-1}, \quad (25)$$

که در تساوی وسط از بهنجاری بودن H استفاده کرده ایم. بنابراین ثابت کرده ایم که H و gHg^{-1} زیر مجموعه یکدیگر هستند و در نتیجه این دو باهم مساوی هستند. حال فرض کنید که شرط بالا برقرار است. آنگاه بهنجاری بودن زیر گروه H واضح می شود.

قبلاً ثابت کردیم که اگر یک زیر گروه بهنجار باشد، آنگاه یک هم مجموعه چپ یک هم مجموعه راست نیز هست و بالعکس. آیا وارون این خاصیت نیز برقرار است؟ یعنی اگر یک زیر گروه چنان باشد که هر هم مجموعه چپ آن هم مجموعه

راست اش نیز باشد و بالعکس، آیا می توان نتیجه گرفت که آن زیر گروه بهنجار است. پاسخ این سوال مثبت است و در قضیه زیر داده شده است.

قضیه: زیر گروه H در G بهنجار است اگر و فقط اگر هر هم مجموعه چپ H در G یک هم مجموعه راست H در G باشد.

اثبات: یک طرف این قضیه را در همان ابتدا ثابت کردیم. اینک طرف دیگرش را می بایست ثابت کنیم. یعنی فرض می کنیم که هر هم مجموعه چپ یک هم مجموعه راست است، یعنی $Ha = aH$. در این صورت یک عضو دلخواه مثل $g \in G$ در نظر می گیریم

$$aHa^{-1} = aa^{-1}H = H, \quad (26)$$

و باتوجه به قضیه قبل نتیجه می گیریم که H یک زیر گروه بهنجار است.

۱.۴ مثالهایی از زیر گروه های بهنجار

مسلم است که هر گروه دو زیر گروه بهنجار بدیهی دارد، یکی زیر گروه تک عضوی $\{e\}$ و دیگری خود گروه. هم چنین بدیهی است که هر زیر گروه از یک گروه آبلی حتماً بهنجار است. علاوه بر این مثالهای ساده می توان به مثال های زیر توجه کرد.

مثال: در گروه $GL_n(C)$ زیر گروه $SL_n(C)$ یعنی زیر گروه ماتریس های با دترمینان واحد یک زیر گروه بهنجار است.

مثال: در گروه $SL_2(C)$ زیر گروه شامل ماتریس های I و $-I$ یک زیر گروه بهنجار است.

۲.۴ گروه های خارج قسمت

هرگاه H یک زیر گروه بهنجار از گروه G باشد هر هم مجموعه چپ آن هم مجموعه راست نیز خواهد بود. بنابراین بجای نماد Ha یا aH ، نماد ساده $[a]$ را بکار می بریم و آن را یک کلاس می نامیم. مجموعه تمام این کلاس ها را با G/H نشان می دهیم و بین کلاس ها عمل ضرب زیر را تعریف می کنیم: $[a][b] := [ab]$. با این تعریف G/H تبدیل به یک گروه می شود که آن را گروه خارج قسمت یا *Quotient Group* می گوئیم. ضرب تعریف شده در بالا به دلیل بهنجاری بودن زیر گروه خوش تعریف است و دارای ابهام نیست. اثبات این امر را به عهده خواننده می گذاریم. هم چنین از این تعریف ضرب می توان نتیجه گرفت که عضو خنثی گروه G/H عبارت است از $[e]$ و وارون عضو $[g]$ عضو $[g^{-1}]$ است. با توجه به این که عناصر گروه G/H همان هم مجموعه ها هستند، نتیجه می گیریم که مرتبه ی گروه $|G/H|$ برابر است با $|G|/|H|$.

۳.۴ مثال هایی از گروه های خارج قسمت

الف: G را گروه اعداد صحیح با عمل جمع و H را زیرگروهی از آن می گیریم که از اعداد صحیح به مضرب n تشکیل شده است، یعنی $H = nZ$. از آنجا که Z آبدلی است زیرگروه H حتماً بهنجار است. زیرگروه H دارای هم مجموعه ها یا کلاس های زیراست:

$$[k] := k + H = k + nZ = \{k + nx, |x \in Z\}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1. \quad (27)$$

درواقع $[k]$ کلاس همه اعدادی است که باقیمانده تقسیم آنها بر n برابر است با k . حال مطابق تعریف داریم

$$[k] + [l] = [k + l], \quad (28)$$

و از آنجا که $[k + n] = [k]$ نتیجه می گیریم که جمع بالا به سنج n انجام می گیرد. بنابراین مجموعه کلاس ها یعنی G/H یا Z/nZ همان گروه دوری Z_n است:

$$Z/nZ \cong Z_n. \quad (29)$$

ب: G را گروه ماتریس های یکانی دو در دو یا $U(2)$ می گیریم و H را زیرگروه $SU(2)$ که از ماتریس های یکانی با دترمینان 1 تشکیل شده است. این زیرگروه بهنجار است زیرا اگر $h \in SU(2)$ آنگاه $\det(h) = 1$ و $\det(ghg^{-1}) = \det(h) = 1$. حال به ازای هر $\phi \in [0, 2\pi]$ ماتریس

$$g = e^{i\frac{\phi}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in U(2)$$

و کلاس

$$[g] = gH = \{gh \in U(2) | \det(g) = e^{i\phi}\} \quad (30)$$

کلاسی از ماتریس های $U(2)$ که دترمینان آنها برابر است با $e^{i\phi}$. می توانیم این کلاس را با $[e^{i\phi}]$ نشان دهیم. هرگاه عضوی از کلاس $[e^{i\phi}]$ را در عضوی از کلاس $[e^{i\phi}]$ ضرب کنیم عضوی بدست می آید که دترمینان آن برابر است با حاصلضرب دترمینان ها یعنی عضوی از کلاس $[e^{i\phi+i\phi}]$. بنابراین تعریف ضرب در گروه خارج قسمت داریم:

$$[e^{i\phi}][e^{i\phi'}] := [e^{i\phi+i\phi'}]. \quad (31)$$

در نتیجه گروه تشکیل شده از کلاس ها با گروه $U(1)$ یعنی گروه اعداد یکانی (فازهای خالص) یکسان است، یعنی

$$U(2)/SU(2) \cong U(1). \quad (32)$$

این نتیجه باهمین استدلال تعمیم پیدامی کند به :

$$U(n)/SU(n) \cong U(1). \quad (33)$$

ج: G را گروه ماتریس های یکانی دو در دو یا $U(2)$ می گیریم و H را زیرگروهی از آن که از ماتریس های متناسب با واحد تشکیل شده است

$$H = \{g | g = e^{i\frac{\phi}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\} \quad (34)$$

این گروه به وضوح با گروه $U(1)$ یکسان است. در ضمن بهنجار هم هست. حال به ازای هر $g \in U(2)$ کلاس $[g]$ از ماتریس های به شکل $e^{i\frac{\phi}{2}}g$ تشکیل شده است که حتماً دارای یک عضو با دترمینان یک هست. این کلاس را می توان باهمان نماینده مشخص کرد. در نتیجه کلاس ها با اعضای $SU(2)$ تناظر یک به یک پیدامی کنند. بنابراین ثابت کرده ایم که:

$$U(2)/U(1) \cong SU(2). \quad (35)$$

این نتیجه باهمین استدلال تعمیم پیدامی کند به

$$U(n)/U(1) \cong SU(n). \quad (36)$$

۵ کلاس های تزویجی

یکی دیگر از ساختارهای مهم در درون گروه که به خصوص در نظریه نمایش گروه های منتهای اهمیت دارد، کلاس های تزویجی است. برخلاف هم مجموعه ها که وابسته به یک زیرگروه خاص هستند، کلاس های تزویجی مستقل از هر زیرگروهی تعریف می شوند.

تعریف: گروه G را در نظر بگیرید. می گوئیم دو عضو $a, b \in G$ با هم هم ارز هستند هرگاه یک عضوی از G وجود داشته باشد به قسمی که $b = gag^{-1}$. به عبارت دیگر می نویسیم

$$a \sim b \iff \exists g \in G, \quad | \quad b = gag^{-1}. \quad (37)$$

واضح است که این رابطه یک رابطه هم ارزی است. خواننده ب راحتی می تواند این گزاره را ثابت کند. می دانیم که هر رابطه هم ارزی یک مجموعه را به کلاس های هم ارزی افراز می کند. هر کدام از این کلاس ها یک کلاس تزویجی نامیده می شود. در یک گروه آبلی هر عضو گروه خود یک کلاس تزویجی است ولی در گروه های غیر آبلی چنین نیست. هم چنین هیچ تناظر یک به یکی بین کلاس های تزویجی مختلف وجود ندارد یعنی اینکه کلاس های مختلف می توانند تعداد اعضایشان متفاوت باشد. برای آنکه کلاس عناصری را که با عنصر $a \in G$ مزدوج هستند بدست بیاوریم کافی است که مجموعه زیر را بدست بیاوریم

$$C_a := \{gag^{-1} \mid g \in G\}. \quad (38)$$

به این ترتیب یک کلاس تزویجی بدست می آید که اعضای آن همه با هم رابطه تزویجی دارند و هم ارزند. دقت کنید که تعداد اعضای این مجموعه لزوماً با تعداد اعضای گروه یکی نیست. مثال: در گروه S_3 با مولد های σ_1 و σ_2 کلاس های تزویجی عبارتند از:

$$C_1 = \{e\}, \quad C_2 = \{\sigma_1, \sigma_2\sigma_1\sigma_2, \sigma_2\}, \quad C_3 = \{\sigma_1\sigma_2, \sigma_2\sigma_1\}. \quad (39)$$

۶ مرکز یک گروه

تعریف مرکز یک گروه⁷ عبارت از مجموعه عناصری از گروه است که با همه عناصر گروه جابجا می شوند.

$$Z(G) := \{z \in G \mid zg = gz \quad \forall g \in G\}. \quad (40)$$

قضیه: مرکز یک گروه یک زیرگروه بهنجار آن است. در واقع مرکز یک گروه همواره یک زیرگروه آبلی است.

اثبات: نخست ثابت می کنیم که مرکز یک زیرگروه است. فرض کنید که z_1, z_2 متعلق به مرکز باشند و $g \in G$ یک عضو دلخواه از گروه باشد. در این صورت

$$(z_1z_2)g = z_1(z_2g) = z_1(gz_2) = (z_1g)z_2 = (gz_1)z_2 = g(z_1z_2). \quad (41)$$

پس مرکز گروه نسبت به ضرب بسته است. حال فرض کنید که $z \in Z$ یک عضو از مرکز گروه باشد. در این صورت داریم $zg = gz$ و با ضرب کردن دو طرف از چپ و راست در $z^{-1} \in G$ و استفاده از شرکت پذیری گروه و خاصیت عضو خنثی بدست می آوریم که $gz^{-1} = z^{-1}g$. بنابراین بدست می آوریم که $z^{-1} \in Z$. در نتیجه مرکز یک گروه خود یک زیرگروه می شود.

⁷Center of the Group

حال ثابت می کنیم که Z یک زیرگروه بهنجار است. فرض کنید که $z \in Z$ و $g \in G$ به ترتیب دو عضو دلخواه از مرکز گروه و خود گروه باشند. در این صورت $gzg^{-1} = z$. این امر بهنجاری بودن زیرگروه را ثابت می کند.

$$gzg^{-1} = z. \quad (42)$$

مثال: مرکز گروه S_3 عبارت است از $\{e\}$. $Z(S_3) = \{e\}$

مثال: مرکز گروه $SU(2)$ عبارت است از Z_2 $Z(SU(2)) = \{I, -I\} \cong Z_2$